

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ



КОРЬ –

острая болезнь вирусной природы с воздушно-капельным путем передачи. Болезнь высококонтагиозна. Не иммунизированные и не болевшие корью при контакте с больным заражаются почти в 100% случаев независимо от возраста.

КОРЬ

страшна осложнениями. К тяжелым осложнениям, наблюдающимся в любом возрасте, относятся менингоэнцефалит, энцефалопатия, полиневрит, серозный менингит, энцефаломиелит.



ПОМНИТЕ:

Специфических лекарственных средств для лечения кори на сегодняшний день не существует, и поэтому только прививка может защитить Вас и Вашего будущего ребенка от этой инфекции.

Если:

- Вы планируете беременность
- Ваш возраст до 35 лет
- Вы не болели корью, не привиты или не имеете сведения о прививках

Не избегайте вакцинацию – это 100 % защита от инфекции и гарант Вашего здоровья!



ФГБУ «Волгоградский региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

Важно! Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Приказ Минздрава РФ №1122н от 6 декабря 2021 года "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"



NASHSTORE

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В



ГЕПАТИТ В –

длительно протекающее воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита В с возможным исходом в цирроз и рак печени.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ – больной человек.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ –

гемоконтактный (через кровь), вертикальный (внутриутробно - от матери к ребёнку).



Потенциально опасные ситуации:

- медицинские процедуры (инъекции, операции, стоматологическое лечение);
- косметические услуги (маникюр, пирсинг, нанесение татуировок).

ПОМНИТЕ:



Для заражения достаточно малой дозы крови (невидимые следы);



Нет специфического лечения против гепатита В;



Вакцинация способна предотвратить заболевание

Если:

- Вы планируете беременность
- Вы не прививались ранее против вирусного гепатита В -

Не избегайте вакцинацию – это 100 % защита от инфекции и гарант Вашего здоровья и здоровья будущего ребёнка!



ФГБУ «Волгоградский региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

Важно! Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Приказ Минздрава РФ №1122н от 6 декабря 2021 года "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"



NASHSTORE

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КРАСНУХИ



КРАСНУХА –

вирусное заболевание острого характера. Формируется при попадании в организм вируса краснухи, поражающего эпителиальную ткань верхних дыхательных путей, группы регионарных лимфоузлов и кожу.

КРАСНУХА –

представляет большую опасность для беременных, которые могут заразиться от больных детей. Заболевание краснухой беременных очень часто приводит к:

- развитию множественных врождённых дефектов плода (болезни сердца, глазные болезни (ухудшение остроты зрения, катаракта, микрофтальмии (атрофия глазного яблока), врождённой глаукомы, косоглазие), снижению слуха, отдалённые задержки умственного развития);
- выкидышам;
- мертворождениям.

Если:

- Вы планируете беременность
- Ваш возраст до 25 лет
- Вы не болели краснухой, не привиты или не имеете сведения о прививках -

**Не избегайте вакцинацию –
это 100 % защита от инфекции
и гарант Вашего здоровья!**



ГБУЗ «Волгоградский региональный
центр общественного здоровья
и медицинской профилактики»

Важно! Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Приказ Минздрава РФ №1122н от 6 декабря 2021 года "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"



NASHSTORE

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ СТОЛБНЯКА



СТОЛБНЯК или ТЕТАНУС –

это острая микробно-токсическая инфекция, которая возникает в результате воздействия особых токсинов столбнячной палочки на нервную систему и мышцы с их поражением. Столбняк проявляется тяжелыми судорожными сокращениями поперечнополосатой и гладкой мускулатуры тела с принятием типичных столбнячных поз.

ОСЛОЖНЕНИЯ:



ЛАРИНГОСПАЗМ – резкое непроизвольное сокращение мышц гортани, при котором возникает затруднение дыхания вплоть до асфиксии и смерти.



АСПИРАЦИОННАЯ ПНЕВМОНИЯ – воспалительные лёгких из-за попадания в них рвотных масс, слюны и т. п.



ПЕРЕЛОМЫ КОНЕЧНОСТЕЙ из-за резких и сильных судорог, возможен разрыв связок.



ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ – закупорка лёгочных артерий тромбами.



СМЕРТЬ ОТ АСФИКСИИ, остановки сердца, эмболии лёгочных артерий, пневмонии

Эффективная защита – вакцинация, проводится до наступления беременности.

При отсутствии сведений о вакцинации прививка взрослым проводится в три приема:

- в день обращения,
- через 1,5 месяца
- и через 12 месяцев.

Затем вакцину вводят через каждые 10 лет.



ГБУЗ «Волгоградский региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

Важно! Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Приказ Минздрава РФ №1122н от 6 декабря 2021 года "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"



NASHSTORE

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ДИФТЕРИИ



ДИФТЕРИЯ –

инфекционная болезнь, вызываемая бактериями дифтерии, передающаяся воздушно-капельным путем, характеризующаяся воспалением преимущественно слизистых оболочек рото- и носоглотки, а также явлениями общей интоксикации и поражением внутренних органов.

ФАКТОР БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ – выделяемый ими токсин.
ИСТОЧНИК ЗАРАЖЕНИЯ – больной или носитель дифтерийной палочки

ОСЛОЖНЕНИЯ:



Инфекционно-токсический миокардит



Инфекционно-токсическая полиневропатия



Параличи и парезы (вялые периферические – парез мягкого нёба)



Инфекционно-токсический шок



Острая надпочечниковая недостаточность



Острая дыхательная недостаточность (дифтерия гортани)

Эффективная защита – вакцинация, проводится до наступления беременности.

При отсутствии сведений о вакцинации прививка взрослым проводится в три приема:

- в день обращения,
- через 1,5 месяца
- и через 12 месяцев.

Затем каждые 10 лет.



ФГБУ «Волгоградский региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

Важно! Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Приказ Минздрава РФ №1122н от 6 декабря 2021 года "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"



NASHSTORE